

貯法：室温保存
有効期間：3年

| | |
|------|------------------|
| 承認番号 | 16100AMZ03836000 |
| 販売開始 | 1986年10月 |

漢方製剤

コタロー-

N34

白虎加人参湯エキス細粒

(ひやつ こ か にん じん とう)

3. 組成・性状**3.1 組成**

| 販売名 | コタロー白虎加人参湯エキス細粒 |
|------|---|
| 有効成分 | 本剤12.0g中 日局チモ 5.0g 日局カンゾウ 2.0g 日局コウベイ 8.0g 日局ニンジン 3.0g 日局セッコウ 15.0g 上記の混合生薬より抽出した水製乾燥エキス8.0gを含有する。 |
| 添加剤 | ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ブルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム |

3.2 製剤の性状

| | |
|-------|---------|
| 剤 形 | 細粒剤 |
| 色 調 | 灰土色～淡褐色 |
| 味 | やや苦い |
| におい | 特異なにおい |
| 識別コード | N34 |

4. 効能又は効果

のどの渇きとほてりのあるもの

6. 用法及び用量

通常、成人1日12.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2 参照]

8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 胃腸の虚弱な患者

口中不快感、食欲不振、胃部不快感、軟便、下痢等があらわれることがある。

9.1.2 著しく体力の衰えている患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用**10.2 併用注意（併用に注意すること）**

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|--|---|---|
| カンゾウ含有製剤 芍薬甘草湯 補中益氣湯 抑肝散 等 グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・L-システイン グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等 [8.2、11.1.1、11.1.2 参照] | 偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパシーがあらわれやすくなる。 | グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。 |

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

11.1.2 ミオパシー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2 参照]

11.2 その他の副作用

| | 頻度不明 |
|-----|-------------------------|
| 過敏症 | 発疹、瘙痒、蕁麻疹等 |
| 肝臓 | 肝機能異常（AST、ALT等の上昇） |
| 消化器 | 口中不快感、食欲不振、胃部不快感、軟便、下痢等 |

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500g [ポリ瓶、バラ]

4.0g×42包 [分包]

4.0g×147包 [分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部

〒531-0071

大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140

(9:00～17:30／土、日、祝日、弊社休日を除く)

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号