

漢方製剤

FC 39

ジュンコウ
苓桂朮甘湯
FCエキス細粒 医療用

りょう けい じゅつ かんとう

(苓桂朮甘湯)

貯法：室温保存
有効期間：3年

承認番号	16100AMY00361000
販売開始	1986年10月

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	ジュンコウ 苓桂朮甘湯 FC エキス細粒 医療用
有効成分	本剤は1日量4.5g中、下記生薬より抽出した水製乾燥エキス（苓桂朮甘湯エキス）2.25gを含有する。 日局 ブクリヨウ 6g 日局 ピャクジユツ 3g 日局 ケイヒ 4g 日局 カンゾウ 2g
添加剤	トウモロコシデンプン、乳糖水和物

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色調	褐色
におい	わずかな芳香
味	やや甘い
識別コード	FC 39

4. 効能又は効果

めまい、ふらつきまたは動悸があり、尿量が減少するものの次の諸症：
神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛

6. 用法及び用量

通常、成人1日4.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
8.2 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意すること。[10.2、11.1.1、11.1.2参照]
8.3 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

10. 相互作用

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カンゾウ含有製剤	偽アルドステロン症	グリチルリチン酸は
芍薬甘草湯	があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。	尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
補中益氣湯		
抑肝散 等		
グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤		
グリチルリチン酸一アシモニウム・グリシン・L-システイン		
グリチルリチン酸一アシモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合錠 等		
[8.2、11.1.1、11.1.2参照]		

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 偽アルドステロン症（頻度不明）

低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.1.2 ミオパチー（頻度不明）

低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。[8.2、10.2参照]

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、瘙痒等

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

126g (1.5g×84包) [分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

TEL 06-6629-9058 FAX 06-6629-9070

HP <https://ohsugi-kanpo.co.jp/>

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

康和薬通有限会社

大阪府柏原市円明町1000-37

26.2 発売元

大杉製薬株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2