

貯法：室温保存
有効期間：3年

	50mg	100mg	200mg
承認番号	22300AMX00326000	22300AMX01205000	22300AMX01206000
販売開始	2011年6月	2003年12月	2003年12月

深在性真菌症治療剤

処方箋医薬品^{注)}

日本薬局方 フルコナゾール注射液

フルコナゾール静注液50mg 「日医工」

フルコナゾール静注液100mg 「日医工」

フルコナゾール静注液200mg 「日医工」

Fluconazole Intravenous Solution

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 次の薬剤を投与中の患者：トリアゾラム、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリrin、ジヒドロエルゴタミン、キニジン、ピモジド、アスナブレビル、ダクラタスピル・アスナブレビル・ベクラブレビル、アゼルニジピン、オルメサルタン メドキソミル・アゼルニジピン、ロミタビド、プロナンセリン、ルラシドン [10.1 参照]
 2.2 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者
 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性 [9.5 参照]

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	フルコナゾール 静注液 50mg「日医工」	フルコナゾール 静注液 100mg「日医工」	フルコナゾール 静注液 200mg「日医工」
有効成分	1バイアル (50mL) 中 フルコナゾール 50mg	1バイアル (50mL) 中 フルコナゾール 100mg	1バイアル (100mL) 中 フルコナゾール 200mg
添加剤	等張化剤		

3.2 製剤の性状

販売名	フルコナゾール 静注液 50mg「日医工」	フルコナゾール 静注液 100mg「日医工」	フルコナゾール 静注液 200mg「日医工」
剤形・性状	水性注射剤 無色澄明		
pH	5.0~7.0		
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	0.9~1.1 (生理食塩液に対する比)	0.8~1.2 (生理食塩液に対する比)	

4. 効能又は効果

- カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症
 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎
 ○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防

6. 用法及び用量

成人	〈カンジダ症〉 通常、成人にはフルコナゾールとして50~100mgを1日1回静脈内に投与する。 〈クリプトコッカス症〉 通常、成人にはフルコナゾールとして50~200mgを1日1回静脈内に投与する。 なお、重症又は難治性真菌感染症の場合には、1日量として400mgまで增量できる。 〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉 成人には、フルコナゾールとして400mgを1日1回静脈内に投与する。
----	---

小児

〈カンジダ症〉

通常、小児にはフルコナゾールとして3mg/kgを1日1回静脈内に投与する。

〈クリプトコッカス症〉

通常、小児にはフルコナゾールとして3~6mg/kgを1日1回静脈内に投与する。

なお、重症又は難治性真菌感染症の場合には、1日量として12mg/kgまで增量できる。

〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉

小児には、フルコナゾールとして12mg/kgを1日1回静脈内に投与する。

なお、患者の状態に応じて適宜減量する。

ただし、1日量として400mgを超えないこと。

新生児

生後14日までの新生児には、フルコナゾールとして小児と同じ用量を72時間毎に投与する。

生後15日以降の新生児には、フルコナゾールとして小児と同じ用量を48時間毎に投与する。

7. 用法及び用量に関する注意

〈効能共通〉

7.1 腎機能障害患者に対する用量調節の目安

腎機能障害患者に投与する場合は、下表に示すクレアチニン・クリアランス値を参考に用量を調節する¹⁾。[9.2、9.8 参照]

クレアチニン・クリアランス (mL/min)	用量の目安
>50	通常用量
≤50 (透析患者を除く)	半量 透析患者
	透析終了後に通常用量

〈造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防〉

7.2 好中球減少症が予想される数日前から投与を開始することが望ましい。

7.3 好中球数が1000/mm³を超えてから7日間投与することが望ましい。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤投与開始にあたっては、あらかじめワルファリン服用の有無を確認し、ワルファリンと併用する場合は、プロトロンビン時間測定及びトロンボテストの回数を増やすなど慎重に投与すること。[10.2 参照]

8.2 血液障害、急性腎障害、肝障害、高カリウム血症、心室頻拍、QT延長、不整脈があらわれるおそれがあるので、本剤の投与に際しては、定期的に血液検査、腎機能・肝機能検査、血中電解質検査、心電図検査等を行うこと。[9.1.2、9.3、11.1.4-11.1.6、11.1.9、11.1.10 参照]

8.3 本剤の投与に際しては、アレルギー既往歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。[9.1.1、11.1.1 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 薬物過敏症の既往歴のある患者（本剤に対して過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと）
[8.3、11.1.1 参照]

9.1.2 心疾患又は電解質異常のある患者

心室頻拍（torsade de pointesを含む）、QT延長、心室細動、房室ブロック、徐脈等があらわれることがある。[8.2、11.1.10 参照]

9.2 腎機能障害患者

投与前にクレアチニン・クリアランス試験を行い、投与量を減ずるか、投与間隔をあけて使用すること。血中フルコナゾール濃度が持続する。[7.1 参照]

9.3 肝機能障害患者

肝機能障害を悪化させることがある。[8.2、11.1.6 参照]

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと。催奇形性を疑う症例報告がある^{2) -4)}。[2.3 参照]

9.6 授乳婦

授乳しないことが望ましい。母乳中への移行が認められている⁵⁾。

9.7 小児等

新生児においては、投与間隔に留意すること。腎機能が未熟なため血中濃度半減期が延長する。

9.8 高齢者

用量ならびに投与間隔に留意するなど慎重に投与すること。本剤は主として腎臓から排泄されるが、高齢者では腎機能が低下していることが多いため高い血中フルコナゾール濃度が持続するおそれがある。[7.1、16.4、16.5 参照]

10. 相互作用

本剤は、CYP2C9、2C19及び3A4を阻害する。

10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トリアゾラム（ハルシオン等） [2.1 参照]	トリアゾラムの代謝遅滞による血中濃度の上昇、作用の増強及び作用時間延長の報告がある ⁶⁾ 。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン（クリアミン配合錠）ジヒドロエルゴタミン [2.1 参照]	アゾール系抗真菌剤等のCYP3A4を阻害する薬剤とエルゴタミンとの併用により、エルゴタミンの血中濃度が上昇し、血管攣縮等の副作用を起こすおそれがある。	カルバマゼピン
キニジン（キニジン硫酸塩）ピモジド [2.1 参照]	これらの薬剤の血中濃度が上昇することにより、QT延長、torsade de pointesを発現するおそれがある。	カルバマゼピンの血中濃度が上昇し、悪心・嘔吐、めまい、複視等が発現したとの報告がある ^{16)、17)} 。
アスナブレビル（スンペプラ）ダクラタスビル・アスナブレビル・ベクラブビル（ジメンシー配合錠） [2.1 参照]	これらの薬剤の血中濃度が上昇することにより、肝胆道系の副作用が発現し、また重症化するおそれがある。	ミダゾラムエプレレノンメサドン
アゼルニジピン（カルブロック）オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン（レザルタス配合錠） [2.1 参照]	イトラコナゾールとの併用によりアゼルニジピンのAUCが上昇することが報告されている。	カルシウム拮抗薬ニフェジピン等ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍薬ビンクリスチンビンプラスチニエリスロマイシン
ロミタピド（ジャクスタピッド） [2.1 参照]	ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。	タクロリムス ²¹⁾ 、シクロスボリン ²²⁾
プロナンセリン（ロナセン）ルラシドン（ラツーダ） [2.1 参照]	これらの薬剤の血中濃度が上昇し、作用が強するおそれがある。	リファブチン

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ワルファリン [8.1 参照]	プロトロンビン時間の延長 ⁷⁾ 、著しいINR上昇及び出血傾向（挫傷、鼻出血、消化管出血、血尿、下血等）の報告がある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP2C9を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
フェニトイントイプロフェンフルルビプロフェン	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある ^{8) -11)} 。	
セレコキシブ	セレコキシブの血中濃度が上昇することがある。本剤を使用中の患者にはセレコキシブの投与を低用量から開始すること。	
ロサルタン	ロサルタンの血中濃度上昇、及び活性代謝物であるカルボン酸体の血中濃度減少の報告がある ¹²⁾ 。	本剤はロサルタンの肝臓における主たる代謝酵素であるCYP2C9を阻害するので、併用により活性代謝物であるカルボン酸体の血中濃度が減少することがある。
HMG-CoA還元酵素阻害薬 フルバスタチン	これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある ^{13) -15)} 。	本剤はフルバスタチンの肝臓における主たる代謝酵素であるCYP2C9を阻害するので、併用によりフルバスタチンの血中濃度が上昇することがある。
アトルバスタチン シンバスタチン等		本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
カルバマゼピン	カルバマゼピンの血中濃度が上昇し、悪心・嘔吐、めまい、複視等が発現したとの報告がある ^{16)、17)} 。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
ミダゾラムエプレレノンメサドン	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある ^{18)、19)} 。	
カルシウム拮抗薬ニフェジピン等ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍薬ビンクリスチンビンプラスチニエリスロマイシン	これらの薬剤の血中濃度上昇のおそれがある ²⁰⁾ 。	
タクロリムス ²¹⁾ 、シクロスボリン ²²⁾	これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある。また、併用により腎障害の報告がある。	
リファブチン	リファブチンのAUC上昇の報告があり、リファブチンの作用が増強するおそれがある ²³⁾ 。	
リトナビルニルマトレリビル・リトナビル	リトナビルのAUC上昇の報告がある。ニルマトレリビル・リトナビルの血中濃度上昇のおそれがある。	
オキシコドン	オキシコドンのAUC上昇の報告がある。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トルバブタン	トルバブタンの血中濃度上昇の報告があり、トルバブタンの作用が増強するおそれがある。やむを得ず併用する際は、トルバブタンを減量あるいは低用量から開始すること。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
イブルチニブ	これらの薬剤の副作用が増強されるおそれがある。やむを得ず併用する際は、これらの薬剤の減量を考慮するとともに、患者の状態を慎重に観察すること。	本剤はこれらの薬剤の主たる代謝酵素であるCYP3Aを阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
ラロトレクチニブ		
レンボレキサント	レンボレキサントの血中濃度上昇の報告があり、傾眠等の副作用が増強されるおそれがある。本剤とレンボレキサントの併用にあたっては、患者の状態を慎重に観察した上で、レンボレキサント投与の可否を判断すること。なお、併用する際はレンボレキサントを1日1回2.5mgとすること。	
バレメトスタッツ	バレメトスタッツの副作用が増強されるおそれがあるので、患者の状態を慎重に観察すること。	
フェンタニル	フェンタニルの血中濃度上昇のおそれがある ²⁴⁾ 。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の代謝が遅れることがある。
リバーロキサバン	リバーロキサバンの血中濃度が上昇したとの報告がある。	
テオフィリン	テオフィリンの血中濃度上昇の報告がある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるチトクロームP450を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
経口避妊薬 エチニルエストラジオール ラジオール レボノルゲストレル等	エチニルエストラジオール ²⁵⁾ 、レボノルゲストレルの血中濃度上昇の報告がある。	
スルホニル尿素系 血糖降下薬 クロルプロパミド グリベンクラミド等	スルホニル尿素系血糖降下薬の血中濃度上昇の報告がある ²⁶⁾ 。また、併用により低血糖の報告がある。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるチトクロームP450を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
ナテグリニド	ナテグリニドのAUC上昇及び血中濃度半減期の延長の報告がある ²⁷⁾ 。	
トレチノイン	中枢神経系の副作用が発現するおそれがある ²⁸⁾ 。	
ジアゼパム	ジアゼパムのAUC上昇及び血中濃度半減期の延長の報告がある ²⁹⁾ 。	本剤はこれらの薬剤の肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4及び2C19を阻害するので、併用によりこれらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
トファシチニブ	トファシチニブのAUCが79%、C _{max} が27%増加したとの報告がある。	
シクロホスファミド	ビリルビンの上昇、クレアチニンの上昇の報告がある ³⁰⁾ 。	本剤はシクロホスファミドの肝臓における主たる代謝酵素であるCYP3A4及び2C9を阻害するので、併用によりシクロホスファミドの血中濃度が上昇することがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アブロシチニブ	アブロシチニブの作用が増強するおそれがある。可能な限り本剤を他の類薬に変更する、又は本剤を休薬する等を考慮すること。	本剤はアブロシチニブの代謝酵素であるCYP2C19を阻害するので、併用によりアブロシチニブの血中濃度が上昇することがある。
アミトリピチリン ノルトリピチリン	これらの薬剤の作用が増強するおそれがある ^{31) 34)} 。	本剤はこれらの薬剤の代謝を阻害するので、これらの薬剤の血中濃度が上昇することがある。
ジドブジン	ジドブジンの血中濃度上昇の報告がある ³⁵⁾ 。	
リファンピシン	本剤の血中濃度の低下及び血中濃度半減期の減少の報告がある ³⁶⁾ 。	リファンピシンは代謝酵素であるチトクロームP450を誘導する。その結果、本剤の肝代謝が増加すると考えられる。
三酸化二ヒ素	QT延長、心室頻拍(torsade de pointesを含む)を起こすおそれがある。	本剤及び三酸化二ヒ素は、いずれもQT延長、心室頻拍(torsade de pointesを含む)を起こすことがある。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック (頻度不明)、アナフィラキシー (頻度不明)
ショック、アナフィラキシー（血管浮腫、顔面浮腫、そう痒等）を起こすことがある。[8.3、9.1.1 参照]

11.1.2 中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN) (頻度不明)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群) (0.04%)

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球增多、異型リンパ球出現等を伴う遷発性の重篤な過敏症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。なお、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること³⁷⁾。

11.1.4 血液障害 (頻度不明)

無顆粒球症、汎血球減少症、血小板減少、白血球減少、貧血等の重篤な血液障害があらわれることがある。[8.2 参照]

11.1.5 急性腎障害 (頻度不明)

急性腎障害等の重篤な腎障害が報告されている。[8.2 参照]

11.1.6 肝障害 (頻度不明)

黄疸、肝炎、胆汁うっ滞性肝炎、肝壊死、肝不全等の肝障害が報告されており、これらの症例のうち死亡に至った例も報告されている。これらの発症と1日投与量、治療期間、患者の性別・年齢との関連性は明らかではない。本剤による肝障害は通常、投与中止により回復している。[8.2、9.3 参照]

11.1.7 意識障害 (頻度不明)

錯乱、見当識障害等の意識障害があらわれることがある。

11.1.8 痙攣 (頻度不明)

痙攣等の神経障害があらわれることがある。

11.1.9 高カリウム血症 (頻度不明)

異常が認められた場合には投与を中止し、電解質補正等の適切な処置を行うこと。[8.2 参照]

11.1.10 心室頻拍 (頻度不明)、QT延長 (頻度不明)、不整脈 (頻度不明)

心室頻拍(torsade de pointesを含む)、QT延長、心室細動、房室ブロック、徐脈等があらわれることがある。[8.2、9.1.2 参照]

11.1.11 間質性肺炎 (頻度不明)

発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常(捻髪音)等が認められた場合には、速やかに胸部X線等の検査を実施し、本剤の投与を中止するとともに、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.12 偽膜性大腸炎 (頻度不明)

偽膜性大腸炎等の重篤な大腸炎(初期症状：発熱、腹痛、頻回の下痢)があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	1%以上	0.1~1%未満	0.1%未満	頻度不明
肝臓	AST、ALT、Al-P、LDH、ビリルビンの上昇		黄疸	
皮膚		発疹		剥脱性皮膚炎
消化器		嘔気、食欲不振	下痢、腹痛、嘔吐	口渴、しゃつきり、腹部不快感、消化不良、鼓腸放屁
精神・神経系				頭痛、手指のこわばり、めまい、傾眠、振戦
腎臓	BUNの上昇	クレアチニンの上昇	乏尿	
代謝異常		低カリウム血症		高コレステロール血症、高トリグリセリド血症、高血糖
血液		好酸球增多	好中球減少	
その他		発熱	浮腫、脱毛、倦怠感	熱感、血管痛、味覚倒錯、副腎機能不全

(注) 使用成績調査を含む³⁸⁾

13. 過量投与

13.1 症状

13.1.1 外国の大患者での過量投与（フルコナゾール1200～2000mg/日、経口投与）の症例報告では、フルコナゾール1600mg/日投与例において、肝機能検査値上昇がみられた。

また、2000mg/日投与例において、中枢神経系障害（錯乱、嗜眠、見当識障害、不眠、悪夢、幻覚）、多形性紅斑、恶心・嘔吐、肝機能検査値上昇等がみられたとの報告がある³⁹⁾。

13.1.2 フルコナゾール8200mg経口摂取後、幻覚、妄想行動の症状があらわれ、48時間の経過観察が行われた結果、症状は回復したとの報告がある。（自殺企図例）

13.2 処置

3時間の血液透析により、約50%が血清より除去される。フルコナゾールは、大部分が腎から排泄される。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

本剤は生理食塩液に溶解してあるため、注射用アムホテリシンBと併用すると白濁を生ずるので混注を避けること。

14.2 薬剤投与時の注意

静注する場合は、1分間に10mLを超えない速度で投与することが望ましい。

16. 薬物動態

16.4 代謝

フルコナゾール100mgをヒトに経口投与した場合、尿中代謝物として1、2、4-トリアゾールがわずかに認められた。投与量の約77%がフルコナゾール未変化体として尿中に排泄された⁴⁰⁾。[9.8 参照]

16.5 排泄

フルコナゾール25mg又は50mgを健常成人に単回静脈内投与したとき、尿中フルコナゾール濃度は用量に対応して増加し、いずれの用量においても投与5日目までの未変化体の尿中排泄率は投与量のはば70%であった⁴¹⁾。[9.8 参照]

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

フルコナゾールは真菌細胞の14- α -ラノステロールの脱メチル化に関与するチトクロームP450を阻害し、膜成分のエルゴステロール生合成を抑制することにより抗真菌作用を示す。また、真菌の酵母型発育相及び菌糸型発育相のいずれに対しても発育抑制を示す。フルコナゾールのエルゴステロール生合成阻害作用は真菌に選択性的で、ラット肝細胞でのステロール生合成に対する影響は少ない^{42)、43)}。

19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：フルコナゾール（Fluconazole）

略号：FLCZ

化学名：2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol

分子式： $C_{13}H_{12}F_2N_6O$


分子量：306.27

性状：白色～微黃白色の結晶性の粉末である。

エタノール（99.5）にやや溶けやすく、水に溶けにくい。

希塩酸に溶ける。

化学構造式：



融点：137～141°C

22. 包装

〈フルコナゾール静注50mg「日医工」〉

50mL×5バイアル

〈フルコナゾール静注100mg「日医工」〉

50mL×5バイアル

〈フルコナゾール静注200mg「日医工」〉

100mL×5バイアル

23. 主要文献

- 1) Berl T., et al.: J. Am. Soc. Nephrol. 1995; 6 (2) : 242-247
- 2) Pursley T. J., et al.: Clin. Infect. Dis. 1996; 22 (2) : 336-340
- 3) Aleck K. A., et al.: Am. J. Med. Genet. 1997; 72 (3) : 253-256
- 4) Molgaard-Nielsen D., et al.: N. Engl. J. Med. 2013; 369 (9) : 830-839
- 5) Force R. W.: Pediatr. Infect. Dis. J. 1995; 14 (3) : 235-236
- 6) 林昌洋 他：皮膚科の臨床. 1996; 38 (8 Suppl. 36) : 1171-1183
- 7) Crussell-Porter L. L., et al.: Arch. Intern. Med. 1993; 153 (1) : 102-104
- 8) Howitt K. M., et al.: Med. J. Aust. 1989; 151 (10) : 603-604
- 9) Hynnen V. V., et al.: Antimicrob. Agents Chemother. 2006; 50 (6) : 1967-1972
- 10) Greenblatt D. J., et al.: Clin. Pharmacol. Ther. 2006; 79 (1) : 125-133
- 11) Zgibor N. K., et al.: Br. J. Clin. Pharmacol. 2007; 63 (4) : 477-487
- 12) Kaukonen K. M., et al.: Eur. J. Clin. Pharmacol. 1998; 53 (6) : 445-449
- 13) Kantola T., et al.: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2000; 56 (3) : 225-229
- 14) Kahri J., et al.: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2005; 60 (12) : 905-907
- 15) Shaukat A., et al.: Ann. Pharmacother. 2003; 37 (7-8) : 1032-1035
- 16) Finch C. K., et al.: South. Med. J. 2002; 95 (9) : 1099-1100
- 17) Ulivelli M., et al.: J. Neurol. 2004; 251 (5) : 622-623
- 18) Ahonen J., et al.: Acta Anaesthesiol. Scand. 1999; 43 (5) : 509-514
- 19) Cook C. S., et al.: Xenobiotica. 2004; 34 (3) : 215-228
- 20) Kremens B., et al.: Br. J. Clin. Pharmacol. 1999; 47 (6) : 707-708
- 21) Manez R., et al.: Transplantation. 1994; 57 (10) : 1521-1523
- 22) Lopez-Gil J. A.: Ann. Pharmacother. 1993; 27 (4) : 427-430
- 23) Trappnell C. B., et al.: Ann. Intern. Med. 1996; 124 (6) : 573-576
- 24) Saari T. I., et al.: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2008; 64 (1) : 25-30
- 25) Sinofsky F. E., et al.: Am. J. Obstet. Gynecol. 1998; 178 (2) : 300-304
- 26) Fournier J. P., et al.: Therapie. 1992; 47 (5) : 446-447
- 27) Niemi M., et al.: Clin. Pharmacol. Ther. 2003; 74 (1) : 25-31
- 28) Vanier K. L., et al.: J. Pediatr. Hematol. Oncol. 2003; 25 (5) : 403-404
- 29) Saari T. I., et al.: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2007; 63 (10) : 941-949
- 30) Marx K. A., et al.: Blood. 2004; 103 (4) : 1557-1559
- 31) Duggal H. S.: Gen. Hosp. Psychiatry. 2003; 25 (4) : 297-298
- 32) Robinson R. F., et al.: Ann. Pharmacother. 2000; 34 (12) : 1406-1409
- 33) Newberry D. L., et al.: Clin. Infect. Dis. 1997; 24 (2) : 270-271
- 34) Gannon R. H., et al.: Ann. Pharmacother. 1992; 26 (11) : 1456-1457
- 35) Sahai J., et al.: J. Infect. Dis. 1994; 169 (5) : 1103-1107
- 36) Coker R. J., et al.: BMJ. 1990; 301 (6755) : 818
- 37) 厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル、薬剤性過敏症症候群
- 38) 厚生省医薬品安全局：医薬品研究. 1998; 29 (12) : 924, 931-933
- 39) Anaissie E. J., et al.: J. Infect. Dis. 1995; 172 (2) : 599-602
- 40) 第十八改正日本薬局方解説書 廣川書店 2021; C4852-C4856
- 41) 柴孝也 他：Jpn. J. Antibiot. 1989; 42 (1) : 17-30
- 42) 森田達也 他：真菌と真菌症. 1986; 27 (3) : 190-197
- 43) 山口英世 他：Jpn. J. Antibiot. 1989; 42 (1) : 1-16

24. 文献請求先及び問い合わせ先

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

TEL (0120) 517-215

FAX (076) 442-8948

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元（輸入）

